

Galeo®

COMPOSIZIONE

Ciproconazolo puro 3,81% (40 g/l)

FORMULAZIONE

Microemulsione (ME)

INDICAZIONI DI RISCHIO

(N) Pericoloso per l'ambiente

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

N° 12084 del 23.02.2009

CONFEZIONI

0,5 lt.

TEMPO DI CARENZA

Frumento e Orzo 30 gg.;
Vite, Albicocco, Mandorlo,
Carciofo, Barbabietola da zucchero 14 gg.;
Pomodoro 10 gg.;
Susino, Pisello, Melo e Pero 7 gg.;
Pesco 3 gg.
Per Asparago tempo di carenza non richiesto.

IMPIEGHI REGISTRATI

COLTURE	AVVERSITÀ
Pesco, Albicocco, Susino, Mandorlo	Oidio, Monilia, Ruggine
Melo, Pero	Ticchiolatura, Oidio
Vite	Oidio, Muffa grigia, Mal dell'Esca
Pomodoro	Cladosporiosi e Oidio
Asparago	Ruggine
Carciofo e Pisello	Oidio
Frumento, Orzo	Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi
Barbabietola da zucchero	Cercospora, Oidio
Floreali, Ornamentali	Oidio, Ruggini

Galeo® è un marchio registrato Gowan Italia.
Ciproconazolo: s.a. originale Syngenta Crop Protection.



Gowan Italia S.p.A.

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546 629911 • Telefax 0546 623943
E-mail: gowanitalia@gowanitalia.it • www.gowanitalia.it



skeda.com - 05/10

Galeo®

La musica è cambiata

**3 GIORNI
DI CARENZA
SU PESCO**

Attività elevata e costante

Formulazione innovativa

Classificazione favorevole

Breve periodo di sicurezza

Residui sempre sotto controllo




**STOP
ALLA
MONILIA
DEL PESCO**



Galeo®

Musica nuova contro la Monilia del pesco



CARATTERISTICHE

GALEO® è un fungicida sistemico a base di **Ciproconazolo 40 g/l** (3,81%), sostanza attiva appartenente alla famiglia chimica dei Triazoli (IBE), dotato di attività specifica per il controllo delle Monilie, Oidio e Ruggini delle drupacee.

GALEO® viene assorbito rapidamente dalla vegetazione trattata (30 minuti circa) e sfugge così al dilavamento delle piogge, garantendo un'ottima e prolungata persistenza d'azione fungicida.

4 Buone ragioni per affidarsi a Galeo®

🎵 Formulazione innovativa

La formulazione in microemulsione (ME) di GALEO®, caratterizzata da particelle di dimensioni molto piccole e dalla sostituzione dei solventi chimici tradizionali con acqua e moderni coformulanti "verdi", rappresenta l'evoluzione più aggiornata dei tradizionali liquidi emulsionabili (EC) e ha consentito di ottenere importanti benefici quali:

- **Miglioramento dell'efficacia biologica**
- **Riduzione della tossicità intrinseca del formulato**
- **Limitazione dell'impatto ambientale e dei rischi connessi con l'utilizzo**
- **Miglioramento della selettività sulle colture**

🎵 Classificazione favorevole

GALEO® è oggi l'unico formulato in commercio a base di **Ciproconazolo puro** di classe tossicologica **favorevole** (Non classificato).

L'assenza di frasi di rischio pericolose ne ha permesso già l'inserimento nel Disciplinare Nazionale di Difesa Integrata e il recepimento nei diversi Disciplinari Regionali.

🎵 Breve periodo di sicurezza

Il breve **tempo di carenza di soli 3 giorni su pesco** permette di intervenire efficacemente in campo fino in prossimità della raccolta e, in caso di necessità, anche tra uno stacco e il successivo.

🎵 Residui sempre sotto controllo

Con l'armonizzazione europea dei residui (Reg. 149 e 839/2008/CE) il limite tollerato del **Ciproconazolo** su pesco-nettarine è raddoppiato (da 0,05 a 0,10 ppm).

Il nuovo valore aumenta ulteriormente i margini di sicurezza per l'impiego e permette di rispettare ampiamente anche i minori livelli di residuo richiesti dalle catene della GDO.

LA MONILIA DEL PESCO

La Monilia è la più grave avversità fungina che attacca il **pesco**, le **nettarine** e le **percoche**, ed è la prima causa di perdite di prodotto nelle fasi di conservazione, commercializzazione e distribuzione al consumo.

I danni in fioritura

Le prime infezioni di monilia (*Monilia laxa*), favorite da periodi caratterizzati da bagnatura prolungata e/o umidità elevata, si manifestano in campo durante il periodo della fioritura causando l'avvizzimento e poi il disseccamento di fiori, germogli e rametti.

Perché trattare in fioritura e in allegagione

In queste fasi la difesa si rende necessaria per **salvaguardare un'ottimale allegagione dei frutti e una buona produzione.**



I danni in pre raccolta

Successivamente, in prossimità della maturazione, è invece il microrganismo *Monilia fructigena* il principale responsabile dell'insorgenza sui frutti di ampie zone marcescenti coperte da cuscinetti circolari di muffa color nocciola.

Perché trattare in pre raccolta

In estate, nel periodo che precede la raccolta, sono sufficienti le rugiade mattutine accompagnate da elevata umidità dell'aria ad innescare il processo infettivo.

La Monilia può produrre **danni diretti immediati**, visibili in campo durante le operazioni di raccolta. Oppure può rimanere latente e causare **marciumi sui frutti dopo la conservazione** nei magazzini frigoriferi, durante l'esposizione nel punto vendita e sulla tavola del consumatore, creando un'immagine negativa che non favorisce il consumo di pesche, nettarine e percoche.

Inoltre i frutti colpiti in campo, rimasti sulle piante dopo la raccolta, tendono a mummificare e diventano la principale **fonte di inoculo per l'anno successivo.**

POSIZIONAMENTO TECNICO SU MONILIA

