

Acramite® 480 SC

Acaricida per il controllo degli acari
sulle colture orticole, melo, pero e agrumi



Acaricida dall'innovativo principio attivo con un nuovo
meccanismo d'azione. È selettivo sugli acari e insetti utili,
compresi gli impollinatori. Adatto a strategie antiresistenza
e indicato nei programmi di lotta integrata sulle colture
orticole, pomacee e agrumi.



Caratteristiche

Composizione:	Bifenazate 480 g/l
Formulazione:	Sospensione concentrata
Classificazione:	Xi - Irritante
Indicazione di pericolo:	N - Pericoloso per l'ambiente
Confezioni:	250 ml
Registrazione n°:	13639 del 04-11-2010



Colture	Acari controllati	Dosi	Modalità d'impiego	Periodo di carenza
Fragola in pieno campo ed in serra	Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	In serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000–1200 l/ha (corrispondenti a 200-300 ml di prodotto/ha e 96–144 g di sostanza attiva/ha) In campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000 l/ha (corrispondenti a 200–250 ml di prodotto/ha e 96–120 g di sostanza attiva/ha)	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.	3 giorni
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Zucchini in pieno campo ed in serra	Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	In serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000–1500 l/ha (corrispondenti a 200–375 ml di prodotto/ha e 96–180 g di sostanza attiva/ha)	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Su ortaggi a frutto effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.	3 giorni
Melo, Pero	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>)	50-67 ml/hl distribuiti con 1500 l di acqua per ettaro (0,75–1 l/ha)	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare una applicazione per anno.	14 giorni
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, limetta, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, chinotto, arancio amaro e mapo)	Ragnetto rosso degli agrumi (<i>Panonychus citri</i>), Ragnetto rosso bimaculato (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto rosso del garofano (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	50 - 60 ml/hl distribuiti con 1000 - 3000 l di acqua per ettaro (corrispondenti a 0,5–1,5 l/ha)	Intervenire al primo apparire dei parassiti. Effettuare una applicazione per anno.	14 giorni

Avvertenze: Acramite 480 SC è stato testato su una ampia gamma di varietà all'interno delle specie esistenti senza riscontrare alcun effetto fitotossico. Poiché non tutte le cultivar sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l'impiego del prodotto in miscela estemporanea con altri prodotti fitosanitari, bagnanti, adesivanti e l'impiego di Acramite 480 SC alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l'assenza di effetti fitotossici.

© Marchio registrato  Chemtura
AGROSOLUTIONS

 SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it