

ACCOLADE® AL CAMPO 2019

Fumigante liquido per impiego in campo su terreno in assenza di coltura e destinato al trapianto/semina di fragola e carota

Composizione di ACCOLADE AL CAMPO 2019

Dimetil disolfuro g. 99,1 (= 1053 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili; H302 Nocivo se ingerito; H331 Tossico se inalato; H317 Può provocare una reazione allergica cutanea; H319 Provoca grave irritazione oculare; H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate; P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol; P273 Non disperdere nell'ambiente; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso; P311 Contattare un Centro Antiveleni o un medico; P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso ed in luogo ben ventilato; P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alla normativa vigente.

Titolare della registrazione: CERTIS EUROPE B.V.

Sede legale: Safarieweg 55 – 3605 Maarssen (Paesi Bassi)
Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno
Tel. 02.9609983

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

ARKEMA Rotterdam B.V., Tankhoofd 10, 3196
Vondelingenplaat, Netherlands

Taglie autorizzate: 200 Kg (contenente 188 l di prodotto)

Registrazione n. 17420 del 02 maggio 2019 del Ministero della Salute

Partita n. : vedere sulla confezione

© marchio registrato ARKEMA

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Rispettare una fascia di rispetto non trattata di:

- 20 metri di cui 18 vegetati dai corpi idrici superficiali per la protezione degli organismi acquatici;
- 20 metri dalle aree residenziali;
- 50 metri dalle aree utilizzate da gruppi vulnerabili.

Per proteggere gli organismi del suolo applicare ad anni alterni.

Durante le operazioni di applicazione, perforazione/taglio e rimozione del film plastico di tipo barriera e per tutte le operazioni in cui si può venire a contatto con il prodotto, utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale: maschera dotata di filtri combinati A2P2, tuta con protezione minima tipo 3, stivali e guanti di gomma nitrile.

Non rientrare nell'area trattata fino alla rimozione del film plastico senza indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattamento sintomatico.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ACCOLADE® AL CAMPO 2019 è un fumigante liquido per il controllo di *Cyperus* spp. da impiegare in pieno campo su terreno in assenza di coltura e destinato al trapianto/semina di fragola e carota.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Per il controllo di *Cyperus* spp., applicare ACCOLADE® AL CAMPO 2019 al dosaggio di 380 l/ha, esclusivamente mediante iniezione nel terreno operata da macchine fumigatrici alla profondità minima di 20 cm.

Effettuare un solo trattamento all'anno con il prodotto sulla stessa superficie.

Immediatamente dopo l'applicazione coprire il terreno con film plastico di tipo barriera, assicurandosi che ogni bordo del film sia ben interrato lungo il perimetro del campo per evitare la fuoriuscita di gas generato dal prodotto.

In funzione della temperatura del suolo rispettare l'intervallo di tempo minimo tra l'applicazione del prodotto e le operazioni successive come riportato nella tabella seguente:

Temperatura del suolo a 10 cm di profondità	Intervallo di tempo minimo (giorni) tra l'applicazione del prodotto e le seguenti operazioni		
	Taglio film plastico	Rimozione film plastico	Trapianto/ semina coltura
> 20°C	20	21	28
tra 15° e 20°C	27	28	35
tra 12° e 15°C	34	35	42

La foratura e/o il taglio del film plastico deve essere effettuato il giorno prima della rimozione del film plastico.

Sono comunque necessari almeno 7 giorni di arieggiamento del terreno dalla rimozione del film plastico prima di effettuare il trapianto/semina.

INDICAZIONI AGRONOMICHE

- Prima dell'applicazione rimuovere accuratamente o interrare profondamente i residui vegetali della coltura precedente.
- Effettuare bagnature del terreno nei 15 giorni precedenti l'applicazione per favorire la germinazione di *Cyperus* spp.
- Il terreno deve essere lavorato in profondità, finemente preparato e privo di zolle prima dell'applicazione. Non effettuare la rullatura del terreno.

- L'umidità del terreno, prima dell'applicazione, deve essere minimo 35% della capacità di campo fino ad un massimo del 75%.
- La temperatura del suolo a 10 cm di profondità deve essere almeno di 12°C per ottenere un'applicazione efficace.
- Interventi erbicidi effettuati nei 3 mesi prima dell'applicazione di ACCOLADE® AL CAMPO 2019 possono ridurne l'efficacia.

AVVERTENZE

- Accertarsi che le macchine fumigatrici impiegate siano compatibili con il prodotto.
- Calibrare le attrezzature prima di iniziare l'applicazione.
- Applicare il prodotto solo in presenza di condizioni di vento e/o brezza nelle 48 ore successive l'applicazione.
- Durante la fase di carico del prodotto nella macchina fumigatrice garantire la "messa a terra" dei fusti.
- Stoccare i fusti in luogo fresco e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta.
- Eventuali perforazioni del film plastico devono essere riparate prontamente.
- Al termine dell'applicazione, effettuare il risciacquo accurato dell'attrezzatura impiegata con acqua pulita per evitare la presenza di residui di prodotto.
- Dopo l'applicazione, esporre segnali di avvertimento in punti appropriati e impedire l'accesso alle aree trattate a personale non autorizzato fino alla rimozione del film plastico

FITOTOSSICITÀ

Se rispettato quanto indicato in etichetta non sono noti casi di fitotossicità. Si consiglia comunque di effettuare il "test del crescione" prima del trapianto.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio del contenitore da parte dell'utilizzatore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

Prodotto autorizzato per uso eccezionale in base all'art. 53 del Reg. EU n. 1107/2009.

Periodo in deroga previsto: dal 01 giugno 2019 al 28 settembre 2019

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 maggio 2019