

## TRATTAMENTI ALLA SEMINA

EPOCA DI INTERVENTO	TARGET	FORMULATI E DOSI
Distribuzione localizzata alla semina	Effetto Starter	<b>FERTISTAR ZM+3E</b> (25-40 kg/ha)
	Protezione da insetti terricoli + Effetto starter	<b>DIASTAR MAXI</b> (12-16 kg/ha; fino a 20 kg in caso di elevato potenziale d'infestazione di Diabrotica) <b>TEFLUSTAR</b> (30-40 kg/ha; fino a 50 kg in caso di elevato potenziale d'infestazione di Diabrotica)
	Protezione da insetti terricoli	<b>UNDERLINE 0,2 G</b> (30-40 kg/ha; fino a 50 kg in caso di elevato potenziale d'infestazione di Diabrotica)

## DIFESA DAGLI INSETTI IN VEGETAZIONE

EPOCA DI INTERVENTO	TARGET	FORMULATI E DOSI
Post-emergenza della coltura, intervenendo in presenza dell'insetto o al superamento delle soglie di danno	Afiti, Nottue, Piralide, Diabrotica  (nb contro Piralide intervenire sempre prima della penetrazione delle larve negli stocchi; in caso di ovideposizioni scalari è consigliabile l'aggiunta di un formulato ad azione ovicida, per es. a base di diflubenzuron)	<b>METEOR</b> (0,6-0,8 l/ha)
		<b>JUDO</b> (0,2-0,25 l/ha)
		<b>COSMOS 440 EC</b> (1 l/ha)

## DISERBO DI PRE-EMERGENZA

EPOCA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INFESTANTE	FORMULATI E DOSI
Pre emergenza del Mais con infestanti in fase di germinazione o di plantula	Infestazioni miste in presenza delle principali infestanti graminacee e dicotiledoni	<b>CLIVIS DUO</b> (3,5-4 l/ha)
	Infestazioni miste in presenza di ruderali ( <i>Abutilon</i> , <i>Xanthium</i> ) con azione sinergica anche sulle graminacee	<b>CLIVIS DUO</b> (3 l/ha) + <b>SULCOCAP</b> (1 l/ha)

Soluzione completa

## DISERBO DI POST-EMERGENZA

EPOCA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INFESTANTE	FORMULATI E DOSI
Post-emergenza del mais (fino a 6 foglie vere) con infestanti emerse nelle prime fasi di sviluppo	Infestazioni di dicotiledoni annuali e perenni, anche in presenza di ruderali ( <i>Abutilon</i> , <i>Xanthium</i> ); ridurre le dosi in caso di impiego in miscela	<b>JOKER</b> (0,8-1,2 l/ha) <b>JOKER 480</b> (0,4-0,6 l/ha) <b>MAISOT</b> (1,5 l/ha)
	Infestazioni miste in presenza di Sorghetta da rizoma ed altre graminacee	<b>SIMUN 40 OD</b> (1,25 l/ha) + <b>MAISOT</b> (0,75 l/ha) + <b>JOKER</b> (0,7 l/ha)

