



SOLUZIONI **ASCENZA** PER IL CONTROLLO DELL'OCCHIO DI PAVONE SU OLIVO

Ivan Di Giorgio
Field Marketing & Development
Ascenza Italia srl
Ivan.digiorgio@ascenza.rovensa.com


ASCENZA®

L'occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*)

L'occhio di pavone è la malattia fungina più importante e diffusa che colpisce l'olivo, causata dal fungo *Spilocaea oleaginea*

Attacca prevalentemente le foglie ma può colpire anche i rametti ancora erbacei e i frutti

CONDIZIONI DI SVILUPPO:

- Temperature tra i 10 e 20 °C (range ottimale tra 14 e 18°C)
- Elevati periodi di bagnatura fogliare almeno 7-8 ore

Condizioni ideali in autunno e primavera



L'occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*)

A causa del cambiamento climatico, l'occhio di pavone si diffonde sempre di più negli areali olivicoli del centro e sud Italia.

Una corretta gestione della problematica consiste in una serie di azioni:

- ✓ Utilizzo di varietà resistenti
- ✓ Sesto d'impianto non troppo stretto
- ✓ Potature frequenti
- ✓ Gestione delle concimazioni azotate
- ✓ Interventi mirati con agrofarmaci



La proposta di ASCENZA® vs Cicloconio

Vegas® 50 WG

Ossiram® 70 Flow




ASCENZA®



Vegas[®] 50 WG



COMPOSIZIONE	Kresoxym Metile 50%	
FORMULAZIONE	Microgranuli idrodispersibili (WG)	
MODALITA' D'AZIONE	Fungicida di copertura dotato di capacità translaminare	
MoA	Analoghi delle strobilurine (QoI)	
CLASSIFICAZIONE	H351 – H410 – EUH401	 
COLTURE & TARGET	Olivo	Occhio di pavone
	Melo	Ticchiolatura, Oidio
	Pero	Ticchiolatura, Maculatura bruna
	Vite	Oidio, Black Rot
	35 gg per tutte le colture	
PHI		





Vegas[®] 50 WG



KRESOXYM METILE è una sostanza attiva appartenente alla famiglia chimica delle strobilurine (QoI) interviene quindi nel processo della respirazione cellulare

C3 Complex III cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase) at Qo site (cyt b gene)	QoI-fungicides (Quinone Outside inhibitors)	Oximino-acetales	Kresoxim-methyl	11
---	--	-------------------------	------------------------	-----------



VEGAS® 50 WG ha mobilità translaminare ad azione preventiva e curativa:

- Inibisce la germinazione delle spore
- Inibisce lo sviluppo del micelio del fungo

VEGAS® 50 WG ha buona affinità con le cere (coefficiente ripartizione ottanolo/acqua Kow LogP 3.4) di conseguenza non dilavabile; assicura una protezione della vegetazione anche in condizioni climatiche particolarmente avverse.





Vegas® 50 WG



VEGAS® 50 WG è adatto ad essere applicato in una strategia per limitare anche le applicazioni dei rameici, noti per la loro azione fitotossica sulle foglie infette provocando filloptosi, VEGAS® 50 WG garantisce quindi una maggiore attività fotosintetica.

Rispetto del Reg. UE 1981/2018 che ha limitato la quantità di rame utilizzabile sulle colture ad una dose di 28 kg in 7 anni.






Ossiram® 70 Flow



COMPOSIZIONE	Ossicloruro di Rame 700 g/l	
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)	
MODALITA' D'AZIONE	Fungicida di copertura ad attività preventiva	
MoA	Multisito 	
CLASSIFICAZIONE	H410 – EUH401	
CULTURE & TARGET	Olivo	Occhio di pavone
	Agrumi	Fitoftora
	Pomacee	Ticchiolatura
	Drupacee	Bolla, Monilia
	Vite	Peronospora
	Pomodoro e Patata	Peronospora
PHI	15 gg arboree e patata; 10 gg p.c. 3 gg serra pomodoro	






Ossiram® 70 Flow



Formulazione di qualità!

- Rispetto al WG la formulazione SC garantisce maggiore adesività > persistenza d'azione
- Buona resistenza al dilavamento
- Formulazione composta da particelle piccole



Distribuzione omogenea

Prontezza d'azione

- Massima miscibilità e solubilità
- Formulazione ben bilanciata. Agitare bene prima dell'uso
- Bassi costi di smaltimento vuoti



Vegas® 50 WG

Olivo



AVVERSITA'	DOSE (g/Ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI
Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)	200	Dall'inizio bottoni fiorali alla mignolatura. Ogni 14 gg	2	35 gg


Ossiram® 70 Flow

Olivo

AVVERSITA'	DOSE (ml/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N° TRATTAMENTI	PHI
Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)	150-250 (max 2,5 l/ha)	Applicare in primavera e/o autunno	2	15 gg



Posizionamento



Ossiram® 70 Flow

Vegas® 50 WG

Ossiram® 70 Flow

I applicazione
Post raccolta

I applicazione
Ripresa vegetativa

II applicazione
Post potatura

II applicazione
Dopo 14 gg





PROSSIMAMENTE...

Kresostar®

Difenoconazolo 12,5 % +

Kresoxym metile 25 %


ASCENZA®



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

Ivan Di Giorgio
Field Marketing & Development
Ascenza Italia srl
Ivan.digiorgio@ascenza.rovensa.com


ASCENZA®