

# PERIMETER®2025

## Fungicida per vite da vino e da tavola in soluzione concentrata (SL)

### Meccanismo d'azione (FRAC): BM01

#### Composizione:

- *Swinglea glutinosa* (estratto) ..... g 82 (902 g/L)
- Coformulanti: quanto basta a ..... g 100

#### ATTENZIONE



#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H319. Provoca grave irritazione oculare.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P101. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102. Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280. Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P305+P351+P338. IN CASO

DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**GOWAN ITALIA S.r.l., via della Costituzione 8, 48018, Faenza (RA)**  
Tel. +39 0546/629911

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 18998 del 27.06.2025**

#### Stabilimento autorizzato per la produzione e/o il confezionamento:

Ecoflora Agro Formulaciones – Zona Franca Rionegro, Warehouse 237, Vereda Chachafruto, Rionegro (Antioquia) - Colombia

#### Stabilimenti di rietichettatura:

Isagro Spa – via Nettunense km 23,400 – 04011 Aprilia (LT)  
Arco Logistica SrL, via Battistella, 22 – 44133 Ferrara (FE)  
Arco Logistica SrL, via Monari, 5 – 44124 Ferrara (FE)

**Taglie:** 1 - 5 litri

**Partita n.:** .....

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere i microrganismi del suolo evitare che il prodotto giunga a diretto contatto con il suolo stesso tramite l'utilizzo di attrezzature che limitino la deriva o la dispersione del prodotto nell'ambiente e mantenendo l'inerbimento o altri metodi di copertura del suolo durante il trattamento. Evitare per quanto possibile il trattamento in presenza di suolo nudo. Evitare eventuali lavorazioni del terreno prima del trattamento. Indossare abbigliamento da lavoro e guanti per le operazioni di rifinitura manuale e raccolta.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di malessere informare il medico e/o consultare un Centro Antiveleni. Terapia sintomatica.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveleni

#### USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

#### MODALITÀ D'AZIONE

Perimeter® 2025 contiene estratto di *Swinglea glutinosa*, appartenente al gruppo di fenoli, sesquiterpeni, triterpenoidi, cumarine. L'estratto di *Swinglea glutinosa* ha diverse modalità d'azione, agendo attraverso il contatto diretto essiccando le strutture fungine, riducendo la crescita del tubulo germinativo del patogeno e stimolando i meccanismi di difesa delle piante.

Il prodotto deve essere impiegato con applicazioni di tipo preventivo, al verificarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dell'infezione. Utilizzare volumi di irrorazione che consentano una completa ed omogenea bagnatura evitando fenomeni di sgocciolamento della vegetazione. Devono essere rispettati le dosi, il numero di trattamenti e l'intervallo fra i trattamenti come riportato nel paragrafo "dosi e modalità di impiego".

Perimeter® 2025 è un fungicida di contatto ad azione preventiva da utilizzare su vite da vino e da tavola contro botrite (*Botrytis cinerea*).

**DOSI E CONDIZIONI D'IMPIEGO:** 2-3 L/ha, numero massimo di trattamenti: 4 (minimo intervallo tra le applicazioni 5 giorni), utilizzando volumi di trattamento raccomandati di 500-1000 L/ha di acqua. Il prodotto si può applicare a partire da inizio fioritura. Si consiglia di impiegare in miscela con un coadiuvante specifico.

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Aggiungere la quantità richiesta di prodotto al serbatoio di irrorazione riempito con almeno metà dal volume d'acqua da impiegare. Agitare bene la miscela, aggiungere eventuali altri prodotti e poi riempire il serbatoio con l'acqua rimanente mantenendo continuamente in agitazione.

Utilizzare sempre subito dopo la miscelazione con acqua ed effettuare il trattamento entro le 6 ore successive alla preparazione della miscela fitoiatrica.

Utilizzare acqua per la diluizione con un pH inferiore a 8. Aggiungere un acidificante se necessario, per scendere al di sotto di questo valore.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** il prodotto non è fitotossico alle condizioni di impiego riportate in etichetta.

**COMPATIBILITÀ:** nella preparazione delle miscele estemporanee con formulati a compatibilità non nota, effettuare comunque preventivamente test di compatibilità fisico-chimica.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** 1 giorno

#### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le normative vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA (24H):  
CHEMREC +1.703.527.3887**