

Scheda identificativa

Vespa spp.

COLORE:

Torace: nero

Addome: primi 3 tergiti addominali bruno molto scuro/nero; 4° tergite di norma interamente giallo

Zampe: parte terminale gialle


Antenne: bruno scuro.

Capo: frontalmente arancio e dorsalmente nero

Nidificazione: nidi esposti (chioma alberi, pali, grondaie)

Dimensioni: circa 17-32 mm

Vespa velutina nigrithorax



COLORE:

Torace: interamente rosso-bruno

Addome: rosso-bruno con banda terminale gialla

Zampe: interamente rosso-brune

Antenne: rosso-brune

Capo: frontalmente giallo e dorsalmente rosso-bruno

Nidificazione: nidi in luoghi riparati (cassoni avvolgibili, cavità/tronchi, tane sotterranee)

Dimensioni: circa 25-35 mm

Vespa orientalis



DISTRIBUZIONE

Sud-est Europa

(Malta, Albania, Grecia, Cipro, Romania e Bulgaria)

Sud Italia fino al Lazio

COLORE:

Torace: marrone

Addome: primi 2 tergiti addominali scuri (marrone) i restanti gialli con macchie scure

Zampe: interamente scure/bruno-rossicce

Antenne: bruno rossiccio.

Capo: frontalmente giallo e dorsalmente rossiccio

Nidificazione: nidi in luoghi riparati (alberi cavi, camini, capanni/solai)

Dimensioni: circa 25-35 mm

Vespa crabro



Differenze *Vespa orientalis* vs *Vespa crabro*



Vespa orientalis




Vespa crabro




Vespa orientalis

1 cm



CAPO
giallo



rosso-bruno



ADDOME

Colorazione secondo
segmento addominale

scura (superiore)
giallo (inferiore)



rosso-bruno

ultimo segmento addominale