

ABSTRIM SW 30



NUTRIZIONE



对抗非生物胁迫的
生物刺激剂：
水分和盐度。
蔬菜专用

认证有效性



生物刺激剂生产线





什么是 CE 生物刺激剂

当外部认证机构保证植物活性功能时, 产品可以被定义为 CE 生物刺激剂 (PFC 6), 该机构评估欧洲肥料法规 (CE REG 2019/1009) 规定的**技术档案**, 其中包括严格的**功效测试**和**对污染物的严格限制**。



ABSTRIM SW 30
认证机构

ABSTRIM SW 30 是一种 CE 非微生物生物刺激剂, 用于预防或治疗园艺植物的**非生物胁迫**, 具有刺激其营养过程的功能。这些测试由国际领先的**测试中心**按照“抗非生物胁迫功能”的具体指导方针进行。

为什么使用 ABSTRIM sw 30



众所周知, 并且大量参考文献也表明, 在园艺中使用生物刺激剂有助于植物克服由各种因素引起的非生物胁迫条件, 这些因素包括: 在受保护环境增加温度的塑料覆盖物、地膜覆盖、通风不足、根瘤层过度盐碱化等。

此外, 最近发生的与热量和水供应有关的气候事件使露地农作物受到进一步的胁迫, 从而带来生产风险。

因此, 在栽培计划中使用**抗胁迫生物刺激剂**变得至关重要, 以保证露天和温室中植物在数量和质量上的最佳生产潜力。

ABSTRIM SW 30 的活性有机成分主要作用于参与**自由基解毒**和**渗透调节**过程的酶。植物源左旋肽氨基酸成分完成其作用, 刺激植物**生化发育**过程中的**蛋白质合成**和养分利用。


有效性数据

工业番茄



类型:	露地 - 巴里
胁迫:	每 2 天用盐水灌溉一次
观察:	平均果重
施用:	5 次叶面喷施, 移栽 5 天后每 6 天喷施一次。
论断:	NT 控制-MR (市场参考) -ABSTRIMSW30

平均果实重量 (克)




辣椒



类型:	露地 - 巴里
胁迫:	每 2 天用盐水灌溉一次
观察:	成熟果实百分比
施用:	5 次叶面喷施, 移栽 20 天后每 12 天喷施一次。
论断:	NT 控制-MR (市场参考) -ABSTRIMSW30

成熟果实百分比




莴苣



类型:	生长室-托尔托纳
胁迫:	每 2 天用盐水灌溉一次
观察:	植物的湿润度
施用:	5 次叶面喷施, 移栽 20 天后每 3 天喷施一次。
论断:	NT 控制-MR (市场参考) -ABSTRIMSW30

湿度水平%



ABSTRIM SW 30



PFC 6 (B) 非微生物植物生物刺激剂

功能: 蔬菜类作物对非生物胁迫的耐受性

- 对**非生物胁迫**的抵抗力更强
- 减少**水分**、盐度和土壤问题的产生



特性

ABSTRIM SW 30 是一种经过认证的生物刺激剂, 采用了 Scam 开发部门开发的特殊配方, 具有增强蔬菜对非生物 (水和盐) 胁迫耐受性的功能。

研究中心测试表明, 从植物生长的早期阶段开始使用 ABSTRIM SW 30 进行预防性处理, 可以增强叶菜、果菜、花卉、观赏植物和药草对非生物胁迫的抵抗力, 并提高最终产量。

- 施肥
- 在植物上的应用
- 3 平均施用率
千克/公顷

配方

液体, 棕色。

包装

瓶装: 1 升装=1.2 千克
罐装: 10 升装= 12 千克

根据欧盟第 2018/848 号和第 2021/1165 号条例, 该产品可用于有机农业。



混溶性和警告

在本产品与其他肥料或植保产品共同使用时未发现任何不相容性, 因此 AbStrim SW 30 可与所有叶面肥料和植物药物肥料混合使用, 但不包括含有多丁、矿物油、三氟丙烷、Fosetil-Al 和多硫化物的产品。

作物

应用期

剂量

剂量

注意

预防: 从物候早期开始。**治疗性:** 在胁迫事件之后的整个作物周期中。

灌溉施肥应用 (软管、微型喷灌机)

叶面喷施
(按建议喷酒量 1000 升/公顷计算)

露地工业番茄、朝鲜蓟、菜花和十字花科植物	预防性施用 3 次。如果胁迫条件持续存在, 每 8-14 天重复施用一次	10 千克/公顷 8 升/公顷	3-3.5 千克/公顷 2.5-2.9 升/公顷	
西瓜、黄瓜、甜瓜、南瓜、西葫芦、草莓、辣椒和番茄	预防性施用 3 次。如果胁迫条件持续存在, 每 8-14 天重复施用一次	10 千克/公顷 8 升/公顷	2.5-3 千克/公顷 2-2.9 升/公顷	在温室中减少剂量 30%
莴苣、芝麻菜、菠菜和叶菜类蔬菜	预防性施用 3 次。如果胁迫条件持续存在, 每 8-10 天重复施用一次	10 千克/公顷 8 升/公顷	2.5 千克/公顷 2 升/公顷	在温室中减少剂量 30%
罗勒、迷迭香、药草	预防性施用 3 次。如果胁迫条件持续存在, 每 8-10 天重复施用一次	8 千克/公顷 6.5 升/公顷	2.5 千克/公顷 2 升/公顷	在温室中减少剂量 30%
胡萝卜、大蒜、洋葱	三次施用间隔 10-15 天	10 千克/公顷 8 升/公顷	--	地面
普通花卉和观赏植物	两次施用间隔 10-15 天	10 千克/公顷 8 升/公顷	--	请勿在开放的花朵上进行叶面喷施



SCAM S.p.A. - 意大利摩德纳市
贝拉里亚路 164 号, 邮编: 41126 - 电话 +39 059 586511 info@scam.it - www.scam.it

