

Sumifly®

INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA BIANCA E DEI TRIPIDI
SU POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, COCOMERO,
ZUCCA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, FAGIOLO, FAGIOLINO,
PISELLO, LENTICCHIA E ORNAMENTALI IN SERRA
OLIO DISPERSIBILE (OD)

Sumifly® - Registrazione del Ministero della Salute n. 18820 del 30.12.2024

COMPOSIZIONE

Paecilomyces fumosoroseus, ceppo FE 9901 g. 9,0 (= 86 g/l)
(equivalente a min. 5x10⁸ spore vitali/ml)
Coformulanti q.b. a g. 100

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Av del Cadí 19-23, Pol. Ind. Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcellona (Spagna)
Tel:+34-938182891 Fax:+34-938921726

Taglie: 125-250-500 ml; 1-5-10 L partita n°

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimento di produzione:
FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Av del Cadí 19-23, Pol. Ind. Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcellona (Spagna)

INDICAZIONI DI PERICOLO: ---

CONSIGLI DI PRUDENZA: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere il viso. P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo FE 9901. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata senza indumenti protettivi finché la vegetazione non è completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: nausea, vomito, mal di testa, senso di oppressione alle tempie, malessere e dolore toracico opprimente. Arrossamento del viso, del collo e del torace, sensazione di calore, brividi e, occasionalmente, broncospasmo. Consigli terapeutici: in caso di ingestione, la decontaminazione digestiva deve essere effettuata in base allo stato di coscienza della vittima. Trattamento sintomatico.

CARATTERISTICHE

Sumifly® è un insetticida biologico per il controllo delle mosche bianche (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*, *Aleurodicus dispersus*, *Lecanoideus floccissimus*) e dei tripidi (*Frankliniella occidentalis*) che attaccano le colture di **POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA E ORNAMENTALI** in serra.

Sumifly® contiene le spore di *Paecilomyces fumosoroseus*, un fungo naturalmente presente nell'ambiente suolo. Le spore agiscono per contatto, germinando sulla cuticola di diverse specie di mosca bianca e di tripidi, sia adulti che uova o larve. Una volta attaccata la cuticola, le ife penetrano nel corpo dell'insetto provocandone la morte nel giro di 3-5 giorni. In condizioni favorevoli di temperatura e umidità, il fungo cresce sulla cuticola dell'insetto producendo a sua volta nuove spore.

DOSI D'IMPIEGO

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA E ORNAMENTALI (coltivate in serra): applicare alla dose di 200-250 mL/hL, con un massimo di 2,5 L/Ha.

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi dell'infestazione, effettuando massimo 4 applicazioni a distanza di 5-7 giorni. In caso di bassa pressione dell'infestazione, l'intervallo tra le applicazioni può essere aumentato fino a 15 giorni.

Applicare il prodotto con irrigatori manuali muniti di ugelli a cono e alla pressione minima di 10 bar o con apparecchiatura equivalente. Utilizzare una quantità di soluzione sufficiente a bagnare uniformemente anche la pagina inferiore delle foglie, utilizzando volumi d'acqua da 500 a 1000 l/ha a seconda dello sviluppo vegetativo evitando il dilavamento.

Non trattare nelle ore più calde della giornata. Intervenire preferibilmente nel tardo pomeriggio o alla sera, quando nelle serre si trova un'alta umidità relativa.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Riempire il serbatoio fino a 1/2 o 3/4 con acqua. Mettere in funzione l'agitatore, versare la quantità necessaria di prodotto e riempire fino al volume desiderato. Utilizzare subito dopo la preparazione.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA:

Una volta applicato il prodotto, si consiglia di sciacquare il serbatoio, gli ugelli e l'attrezzatura utilizzata con acqua pulita, rimuovendo eventuali residui di prodotto che potrebbero rimanere attaccati e svuotare l'acqua di pulizia evitando la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Si consiglia di risciacquare 3 volte.

COMPATIBILITÀ

In generale Sumifly® non è compatibile con i prodotti fungicidi. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta di POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO; 3 giorni prima della raccolta per FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, LENTICCHIA

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

IL PRODOTTO È STABILE PER MAX 36 MESI SE CONSERVATO A TEMPERATURE INFERIORI A 4°C
IL PRODOTTO È STABILE PER MAX 24 MESI SE CONSERVATO A TEMPERATURE MAGGIORI DI 4°C E INFERIORI A 26°C
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO