Registrazione	14165 del 05.03.2012
Composizione	Fluazinam 500 g/l
Classificazione	Xn, N
Formulazione	SC
Confezioni	1 L - 5 L

NANDO™ MAXI

Classe tox	Xn, N
Vite da vino (28 gg)	100-150 ml/hl
Melo (63 gg)	100* ml/hl
* anche Alternaria	
Pero (63 gg)	100 ml/hl
Patata (7 gg)	300-400 ml/hl

Distanziare di almeno 14 giorni l'impiego di Nando Maxi dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).
Non miscelare Nando Maxi con preparati che contengono olio (EW, OD ed altri).
Qualora l'olio sia utilizzato come bagnante/veicolante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (= 200 ml per 100 litri), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra Nando Maxi ed il trattamento con olio può essere ridotto ad 8/10 giorni.

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it

NANDO™ MAXI

Lo specialista del pero

Unico formulato a base di Fluazinam registrato sulla maculatura bruna

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

Timing di Applicazione - Dose: 1 – 1,5 l/ha

1 - 2 interventi ogni 7 – 10 giorni
per il controllo di Botrite, Monilia, Ticchiolatura, Maculatura

Max 3 applicazioni (non più di 2 consecutive)
ogni 7 – 10 giorni per il controllo della Maculatura

Piena fioritura

Caduta petali

Frutticino formato

Interrompere i trattamenti alla 2ª-3ª decade di Giugno. Max 4 trattamenti anno. Tempo di carenza su pero 63 gg.

Trattamento con Nando Maxi

Trattamento con rame aziendale

Azione multisito, no resistenze
Ampio spettro di azione
Grande selettività sui frutti
Efficace al livello dei migliori standard
Esclusivo sul mercato

Prove di efficacia su *Stemphylium vesicarium*



Terremerse
(loc. Mandriole RA)
cv Conference

% Efficacia su lesioni dei frutti (05/08/2011)

6 applicazioni dall' 11/5 al 27/6



Diproval Bologna
(loc. Altedo BO)
cv Abate Fetel

% Efficacia su lesioni dei frutti (10/09/2012)

11 applicazioni dal 20/4 al 31/7