



<b>Registrazione</b>	14165 del 05.03.2012
<b>Composizione</b>	Fluazinam 500 g/l
<b>Classificazione</b>	Xn, N
<b>Formulazione</b>	SC
<b>Confezioni</b>	1 L - 5 L

# NANDO<sup>TM</sup> MAXI

<b>Classe tox</b>	Xn, N
<b>Vite da vino (28 gg)</b>	100-150 ml/hl
<b>Melo (63 gg)</b>	100* ml/hl
* anche Alternaria	
<b>Pero (63 gg)</b>	100 ml/hl
<b>Patata (7 gg)</b>	300-400 ml/hl

**Distanziare di almeno 14 giorni l'impiego di Nando Maxi dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).**

**Non miscelare Nando Maxi con preparati che contengono olio (EW, OD ed altri).**

Qualora l'olio sia utilizzato come bagnante/veicolante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (= 200 ml per 100 litri), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra Nando Maxi ed il trattamento con olio può essere ridotto ad 8/10 giorni.



[www.siapa.mi.it](http://www.siapa.mi.it)

**Siapa**

Alle radici del futuro

# NANDO<sup>TM</sup> MAXI

## Lo specialista del pero

Unico formulato a base di Fluazinam  
registrato sulla maculatura bruna



**Siapa**

## Timing di Applicazione - Dose: 1 – 1,5 l/ha

**1 - 2 interventi ogni 7 – 10 giorni**  
per il controllo di Botrite, Monilia, Ticchiolatura, Maculatura




**Piena fioritura**



**Caduta petali**



**Frutticino formato**



**Trattamento con  
Nando Maxi**

**Trattamento con  
rame aziendale**

**Azione multisito, no resistenze**  
**Ampio spettro di azione**  
**Grande selettività sui frutti**  
**Efficace al livello dei migliori standard**  
**Esclusivo sul mercato**



### Prove di efficacia su *Stemphylium vesicarium*

