



Registrazione	14165 del 05.03.2012
Composizione	Fluazinam 500 g/l
Classificazione	Xn, N
Formulazione	SC
Confezioni	1 L - 5 L

NANDOTM MAXI

Classe tox	Xn, N
Vite da vino (28 gg)	100-150 ml/hl
Melo (63 gg)	100* ml/hl
* anche Alternaria	
Pero (63 gg)	100 ml/hl
Patata (7 gg)	300-400 ml/hl

Distanziare di almeno 14 giorni l'impiego di Nando Maxi dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).

Non miscelare Nando Maxi con preparati che contengono olio (EW, OD ed altri).

Qualora l'olio sia utilizzato come bagnante/veicolante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (= 200 ml per 100 litri), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra Nando Maxi ed il trattamento con olio può essere ridotto ad 8/10 giorni.



NANDOTM MAXI

Lo specialista del pero

Unico formulato a base di Fluazinam registrato sulla maculatura bruna



 SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

www.sumitomo-chem.it

 SUMITOMO CHEMICAL ITALIA

Timing di Applicazione - Dose: 1 – 1,5 l/ha

1 - 2 interventi ogni 7 – 10 giorni
per il controllo di Botrite, Monilia, Ticchiolatura, Maculatura




Piena fioritura



Caduta petali



Frutticino formato



Trattamento con Nando Maxi

Trattamento con rame aziendale

Azione multisito, no resistenze
Ampio spettro di azione
Grande selettività sui frutti
Efficace al livello dei migliori standard
Esclusivo sul mercato



Prove di efficacia su *Stemphylium vesicarium*

