



KESTREL®

Insetticida sistemico ad ampio spettro

La formulazione che fa la differenza

SPECIALE OLIVO

NUOVE ESTENSIONI DI ETICHETTA

MOSCA e TIGNOLA
dell'Olivo



SUMITOMO CHEMICAL

Creative Hybrid Chemistry
For a Better Tomorrow



PRINCIPIO ATTIVO	N. REGISTR.	AVVERSITÀ	DOSE	FORMULAZIONE CONCENTRATA = MIGLIOR GESTIONE DEL MAGAZZINO Meno contenitori da movimentare e da smaltire
Acetamiprid 200 g/l	16690 del 07/02/2018	Mosca dell'olivo Tignola dell'olivo	25-50 ml/hl (0,5 l/ha)	
Intervallo di sicurezza: 7 giorni				

TIGNOLA DELL'OLIVO

Monitoraggio e lotta integrata

Contro la **TIGNOLA DELL'OLIVO**, **KESTREL**® può essere efficacemente impiegato con funzione ovo-larvicida sulla seconda generazione (prima generazione carpo-faga), seguito da prodotti specifici ad azione larvicida (come BioBit® DF/DiPel® DF) per completarne la copertura.



Marzo



Sumitrap



Installare Sumitrap in pre-fioritura

Aprile

1° VOLO

Generazione antofaga

Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Maggio

Soglia di intervento:

Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati

Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

Giugno

2° VOLO

Generazione carpo-faga

fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Luglio

Soglia di intervento:

10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

oppure



KAIMO® **SORBIE**

15-20 g/hl (150-300 g/ha)



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

oppure



KAIMO® **SORBIE**

15-20 g/hl (150-300 g/ha)



BioBit® **DF**

DiPel® **DF**

Bacillus thuringiensis
subsp. *kurstaki*

60-80 g/hl
(600-800 g/ha)

zero giorni di carenza

MOSCA DELL'OLIVO

Monitoraggio e lotta integrata

Contro la **MOSCA DELL'OLIVO** **KESTREL**® può essere impiegato alla prima comparsa degli adulti con attrattivo (esca) e da agosto in poi con applicazione fogliare. Vista la necessità di colpire le larve nei primi stadi, evitando che penetrino troppo in profondità nella drupa, è bene monitorare la presenza di adulti con trappole a feromoni della linea Olytrap di Sumitomo e trattare al raggiungimento della soglia del 2-3 % di infestazione.



Olytrap



Installare Olytrap tra fine fioritura e inizio allegagione

Agosto

Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 2-3% per olive da olio
- Prime catture per olive da tavola

Settembre

Ottobre



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

x2

2 trattamenti a distanza di 14-18 giorni a seconda del grado di infestazione

Tempi di carenza: 7 GIORNI

Massimo 2 trattamenti per stagione

APPLICAZIONE LOCALIZZATA CON ESCHE ATTRATTIVE:

Applicare **KESTREL**® alla dose di 100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di un'esca alimentare/attrattiva per il fitofago al 2% o alle condizioni di impiego previste per l'esca.

È sufficiente irrorare il 50% delle piante ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.