

# LA MICORIZZAZIONE DELLE GIOVANI PIANTE D'OLIVO

## I benefici della micorizzazione

- **Incrementa le funzioni fisiologiche** durante tutto il ciclo colturale
- **Espande la funzionalità delle radici** tramite una fitta rete di ife incrementandone la superficie di oltre 600 volte
- **Migliora l'efficienza nutrizionale** producendo enzimi in grado di liberare nutrienti altrimenti immobilizzati nel suolo: Azoto, Fosforo e Microelementi
- **Migliora l'efficienza idrica**, l'assorbimento dell'acqua e la **tolleranza agli stress** abiotici come caldo e siccità




### MICORRIZE IN POLVERE

con una concentrazione di **132.000 propaguli/kg**

**4 ceppi** presenti (*Rhizophagus irregularis*, *Claroideoglomus luteum*, *Claroideoglomus etunicatum* e *Claroideoglomus claroideum*) con **acidi umici** e batteri benefici della rizosfera.

- **Perfetta idrosolubilità**, nessuna occlusione ed estrema facilità di miscelazione
- **Efficace e veloce colonizzazione**, in pochi giorni sono visibili i primi benefici



### CONCIME MICROGRANULARE FOSFO-AZOTATO NP 5-16 con micorrize concentrate e attive

- **4 ceppi** di micorrize presenti
- Matrice organica nobile **completamente biodisponibile**
- Azoto organico a **lento rilascio**
- Fosforo completamente biodisponibile proveniente da **fosfati naturali teneri**





# DOSI E UTILIZZO CONSIGLIATO

## Per l'uso in vivaio e la creazione del terriccio:

**MycoStart BIO 60 g/m<sup>2</sup> o 800 g/m<sup>3</sup>**

Miscelare il prodotto in modo uniforme con torba o terriccio.

## Irrigazione dei vasetti contenitori:

**MycoApply DR 0,2 g per ogni piantina**

Da disciogliere nelle quantità d'acqua utilizzata di consueto.

## Oppure al trapianto:

**MycoStart BIO 5-10 g/pianta**

Al momento del trapianto si suggerisce di mescolare bene il prodotto al terreno e di non superare la dose consigliata.

## Irrigazione post-trapianto:

**MycoApply DR 0,5 - 1 kg/hl di acqua**

1. Iniziare l'irrigazione solo con acqua e inumidire il terreno (50% volume irrigazione);
2. Sciogliere MycoApply DR e applicare la soluzione irrorando una quantità d'acqua sufficiente (30% volume irrigazione);
3. Continuare l'irrigazione solo con acqua per favorire una migliore penetrazione nella rizosfera (20% volume irrigazione).

## Richiamo I e II anno (facoltativo):

**MycoApply DR 1,7 kg/ha** (vedi sopra, come irrigazione post-trapianto)

## Nota bene:

È possibile miscelare con i comuni concimi (usando prodotti con pH compreso tra 4,5 e 8 ed evitando dosi di fosforo superiori a 100 ppm).

Compatibile con la maggior parte dei fungicidi.

