


TIGNOLA (*Prays oleae*) MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

Marzo



Sumitrap



Installare Sumitrap in pre-fioritura e alle prime catture valutare la soglia di intervento

Aprile

1° VOLO

Generazione antofaga

Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Soglia di intervento:

Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati



DiPel® DF

Dose: 60-80 g/hl

e/o



KAIMO® SORBIE

15-20 g/hl (150-300 g/ha)

Maggio

Giugno

Luglio

2° VOLO

Generazione carpofaga

fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Soglia di intervento:

10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)



DiPel® DF

Dose: 60-80 g/hl

e/o



KAIMO® SORBIE


15-20 g/hl (150-300 g/ha)



MOSCA (*Bactrocera oleae*) MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA



Olytrap



Installare Olytrap in post-allegagione e alle prime catture valutare la soglia di intervento

Agosto

Settembre

Ottobre

- ✓ Posizionare 2-3 trappole/ha per Olytrap o 4-5 trappole/ha per Colortrap
- ✓ Attaccare le trappole ad altezza uomo, esternamente alla chioma, con orientamento sud-sud ovest
- ✓ Sostituire gli erogatori di feromone ogni 4-5 settimane
- ✓ Con le catture oltre la soglia di intervento: valutare ogni settimana, dalla fase di ingrossamento frutti, la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 drupe a caso su 10 piante)



Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 2-3% per olive da olio
- Prime catture per olive da tavola



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

x2

2 trattamenti a distanza di 14-18 giorni a seconda del grado di infestazione

Tempo di carenza: 7 GIORNI
Massimo 2 trattamenti per stagione

OPPURE


APPLICAZIONE LOCALIZZATA CON ESCHE ATTRATTIVE:

Applicare **KESTREL®** alla dose di 100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di un'esca alimentare/attrattiva per il fitofago al 2% o alle condizioni di impiego previste per l'esca. È sufficiente irrorare il 50% delle piante ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).

DIFESA OLIVO

TIGNOLA
Monitoraggio
e lotta integrata



 **SumiTrap**

Aprile-Maggio:
1° volo gen. antofaga

 **DiPel® DF**

Dose: 60-80 g/hl

e/o

 **KAIMO® SORBIE**

Dose: 15-20 ml/hl

Giugno-Luglio:
2° volo gen. carpofaga

 **DiPel® DF**

Dose: 60-80 g/hl

e/o

 **KAIMO® SORBIE**

Dose: 15-20 ml/hl

MOSCA
Monitoraggio
e lotta integrata

In presenza di
MOSCA

 **KESTREL®**
x2

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

 **OlyTrap**

PRE FIORITURA
Fine Aprile - inizio Maggio

 **TRI-BASE®**

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Siapa**

Dose: 200 ml/hl

+

 **Pushy®**

Dose: 400 ml/hl

OPPURE

 **Siapton10L**

Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro

Dose: 200-300 ml/hl

In presenza di
COCCINIGLIA
Admiral®
GOLD

Dose: 25-30 ml/hl

POST ALLEGAGIONE
Inizio Giugno

 **TRI-BASE®**

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Siapa**

Dose: 200 ml/hl

+

 **Pushy®**

Dose: 400 ml/hl

OPPURE

 **Siapton10L**

Dose: 300-400 ml/hl

+

Manni-Plex Boro

Dose: 200-300 ml/hl

ACCRESCIMENTO DRUPE
Agosto - Settembre

 **TRI-BASE®**

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Siapa**

Dose: 200 ml/hl

+

 **Pushy®** Dose: 400 ml/hl

Manni-Plex K Dose: 400-600 ml/hl

OPPURE

 **Pushy®** Dose: 400 ml/hl

+

Manni-Plex Ca

Dose: 150-200 ml/hl

POST RACCOLTA
Fine Novembre

 **TRI-BASE®**

Dose:
250-300 ml/hl

OPPURE

 **Pasta Siapa**

Dose: 200 ml/hl

+

 **Siapton10L**

Dose: 300-400 ml/hl

Siapa

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).