


TIGNOLA (*Prays oleae*) MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA

Marzo



Sumitrap



Installare Sumitrap in pre-fioritura e alle prime catture valutare la soglia di intervento

Aprile

1° VOLO

Generazione antofaga

Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Soglia di intervento:

Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati
Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati



BioBit® DF

Dose: 60-80 g/hl

e/o



KAIMO® SORBIE

15-20 g/hl (150-300 g/ha)

Maggio

Giugno

Luglio

2° VOLO

Generazione carpofaga

fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Soglia di intervento:

10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)



BioBit® DF

Dose: 60-80 g/hl

e/o



KAIMO® SORBIE

15-20 g/hl (150-300 g/ha)



MOSCA (*Bactrocera oleae*) MONITORAGGIO E LOTTA INTEGRATA


Agosto

Settembre

Ottobre



Olytrap



Installare Olytrap in post-allegagione e alle prime catture valutare la soglia di intervento

- ✓ Posizionare 2-3 trappole/ha per Olytrap o 4-5 trappole/ha per Colortrap
- ✓ Attaccare le trappole ad altezza uomo, esternamente alla chioma, con orientamento sud-sud ovest
- ✓ Sostituire gli erogatori di feromone ogni 4-5 settimane
- ✓ Con le catture oltre la soglia di intervento: valutare ogni settimana, dalla fase di ingrossamento frutti, la percentuale di infestazione attiva su campioni di 100 drupe (10 drupe a caso su 10 piante)



Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 2-3% per olive da olio
- Prime catture per olive da tavola



KESTREL®

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

x2

2 trattamenti a distanza di 14-18 giorni a seconda del grado di infestazione

Tempo di carenza: 7 GIORNI

Massimo 2 trattamenti per stagione

OPPURE

APPLICAZIONE LOCALIZZATA CON ESCHE ATTRATTIVE:

Applicare **KESTREL®** alla dose di 100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di un'esca alimentare/attrattiva per il fitofago al 2% o alle condizioni di impiego previste per l'esca. È sufficiente irrorare il 50% delle piante ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.

DIFESA OLIVO

PRE FIORITURA
Fine Aprile - inizio Maggio

 **CUPROXAT® SDI**
Dose: 250-300 ml/hl
OPPURE
 **Pasta Caffaro®**
Dose: 200 ml/hl

 **Pushy®**
Dose: 400 ml/hl
OPPURE
 **HUMOZON® IO L**
Dose: 300-400 ml/hl
+
Manni-Plex Boro
Dose: 200-300 ml/hl

In presenza di
COCCINIGLIA
 **Juvinal® GOLD**
Dose: 25-30 ml/hl

TIGNOLA
Monitoraggio
e lotta integrata


SumiTrap®

Aprile-Maggio:
1° volo gen. antofaga

 **BioBit® DF**
Dose: 60-80 g/hl
e/o

 **KAIMO® SORBIE**
Dose: 15-20 ml/hl

POST ALLEGAGIONE
Inizio Giugno

 **CUPROXAT® SDI**
Dose: 250-300 ml/hl
OPPURE
 **Pasta Caffaro®**
Dose: 200 ml/hl

 **Pushy®**
Dose: 400 ml/hl
OPPURE
 **HUMOZON® IO L**
Dose: 300-400 ml/hl
+
Manni-Plex Boro
Dose: 200-300 ml/hl



Giugno-Luglio:
2° volo gen. carpofaga

 **BioBit® DF**
Dose: 60-80 g/hl
e/o

 **KAIMO® SORBIE**
Dose: 15-20 ml/hl

ACCRESCIMENTO DRUPE
Agosto - Settembre

 **CUPROXAT® SDI**
Dose: 250-300 ml/hl
OPPURE
 **Pasta Caffaro®**
Dose: 200 ml/hl

 **Pushy®** Dose: 400 ml/hl
+
Manni-Plex K
Dose: 400-600 ml/hl
OPPURE
 **Pushy®** Dose: 400 ml/hl
+
Manni-Plex Ca
Dose: 150-200 ml/hl

In presenza di
MOSCA

 **KESTREL®**
x2
25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

MOSCA
Monitoraggio
e lotta integrata


OlyTrap®

POST RACCOLTA
Fine Novembre

 **CUPROXAT® SDI**
Dose: 250-300 ml/hl
OPPURE
 **Pasta Caffaro®**
Dose: 200 ml/hl

+  **HUMOZON® IO L**
Dose: 300-400 ml/hl

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**
www.sumitomo-chem.it

Il posizionamento dei prodotti è da considerarsi indicativo e soggetto ad adattamenti in funzione delle realtà locali. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia alle schede dei prodotti disponibili anche in internet; usare i prodotti fito-sanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.).