# **Esquive** WP

Il trichoderma rapido e vitale anche a basse temperature

## La risposta biologica e moderna al Mal dell'Esca!

- Attivo anche a basse temperature (5°C)
- Impiegabile subito dopo la potatura (spray o spennellatura)
- Subito pronto all'uso: non necessita di pre-attivazione
- Massima affinità con le fibre del legno, ottima penetrazione ben oltre la linea di taglio

Il *Trichoderma atroviride* agisce come antagonismo biologico verso gli agenti patogeni e ha la capacità di colonizzare immediatamente tutti gli spazi vuoti e a rischio di infezione del legno della vite.

Viene definito simbionte opportunistico perché in grado di instaurare una significativa competizione fisica e nutrizionale con i patogeni, inoltre ne inibisce il metabolismo e li degrada, esercitando di conseguenza un efficace biocontrollo naturale.

Fungicida a base di
Trichoderma atroviride ceppo I-1237
autorizzato per combattere
le malattie del legno della vite:
Mal dell'Esca, Eutipiosi
e Black Dead Arm

Formulazione: polvere bagnabile Confezione disponibile: 1 kg







Num Reg Min. 16951 del 13-06-2018









### La risposta biologica e moderna al Mal dell'Esca!

Grazie alle sue modalità d'azione, ESQUIVE WP limita e ritarda significativamente la progressione dei diversi gruppi patogeni presenti nel legno della vite, contribuendo pertanto alla riduzione della diffusione dei sintomi nel vigneto e in particolare dei ceppi affetti da apoplessia.




T. Atroviride I-1237 vs N. parvum; 12°C; 14 giorni di incubazione



T. Atroviride I-1237 vs E. Lata; 12°C; 21 giorni di incubazione

#### Velocità di crescita di differenti ceppi di Trichoderma a 5°C



ESQUIVE WP è il Trichoderma in grado di svolgere la sua funzione di colonizzazione e di competizione anche a temperature molto basse.

Essendo perfettamente attivo e vitale anche a 5°C, Esquive WP è ideale per il trattamento invernale **immediatamente successivo alla potatura**, quando le piante sono più esposte a una possibile infezione.

#### **VANTAGGI**

- Maggiore protezione dei tagli di potatura durante il periodo invernale
- Cresce più rapidamente degli altri ceppi di Trichoderma alle basse temperature
- Dopo 1 h dall'applicazione a 10°C, ESQUIVE WP è già presente all'interno del legno
- Elevata penetrazione all'interno dei tralci (colonizza oltre il secondo internodo)
- Ampia adattabilità in ambienti acidi e alcalini (resiste a pH compresi tra 3 e 8)

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Pronto all'uso: non è necessaria la pre-attivazione
- Buona **resistenza al dilavamento** (anche in caso di pioggia dopo le 4h dall'applicazione)
- Non servono bagnanti
- Dose d'applicazione: 4 kg/ha (trattare entro 12 ore dalla preparazione della soluzione)
- Si consiglia di utilizzare un volume d'acqua di 150-200 L/ha in modo da coprire tutte le ferite da potatura
- Si consiglia sempre l'eliminazione dei residui di potatura del vigneto

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)





