



# KESTREL®

Insetticida sistemico ad ampio spettro

## La formulazione che fa la differenza

SPECIALE OLIVO

NUOVE ESTENSIONI DI ETICHETTA

MOSCA e TIGNOLA  
dell'Olivo



 **SUMITOMO CHEMICAL**

Creative Hybrid Chemistry  
For a Better Tomorrow

  
**Nufarm**

PRINCIPIO ATTIVO	N. REGISTR.	AVVERSITÀ	DOSE	FORMULAZIONE CONCENTRATA
Acetamiprid 200 g/l	16690 del 07/02/2018	Mosca dell'olivo Tignola dell'olivo	25-50 ml/hl (0,5 l/ha)	<b>MIGLIOR GESTIONE DEL MAGAZZINO</b> Meno contenitori da movimentare e da smaltire

Intervallo di sicurezza: **7 giorni**

# TIGNOLA DELL'OLIVO

Monitoraggio e lotta integrata

Contro la **TIGNOLA DELL'OLIVO**, **KESTREL®** può essere efficacemente impiegato con funzione ovo-larvicida sulla seconda generazione (prima generazione carpo-faga), seguito da prodotti specifici ad azione larvicida (come BioBit® DF/DiPel® DF) per completarne la copertura.



Marzo



Sumitrap



Installare Sumitrap in pre-fioritura

Aprile

## 1° VOLO

Generazione antofaga

Fine Marzo-Maggio con picchi nella seconda metà di Aprile

Maggio

Soglia di intervento:

Olive da olio: > 30-35% dei fiori attaccati

Olive da tavola: > 15-20% dei fiori attaccati

Giugno

## 2° VOLO

Generazione carpo-faga

fine Maggio-Giugno con picchi verso la metà di Giugno

Luglio

Soglia di intervento:

10-15% di larvette in penetrazione (olive infestate)



**KESTREL®**

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

oppure



**KAIMO® SORBIE**

15-20 g/hl (150-300 g/ha)



**KESTREL®**

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

oppure



**KAIMO® SORBIE**

15-20 g/hl (150-300 g/ha)



**BioBit® DF**

**DiPel® DF**

*Bacillus thuringiensis*  
subsp. *kurstaki*

60-80 g/hl  
(600-800 g/ha)

zero giorni di carenza

# MOSCA DELL'OLIVO

Monitoraggio e lotta integrata

Contro la **MOSCA DELL'OLIVO** **KESTREL®** può essere impiegato alla prima comparsa degli adulti con attrattivo (esca) e da agosto in poi con applicazione fogliare. Vista la necessità di colpire le larve nei primi stadi, evitando che penetrino troppo in profondità nella drupa, è bene monitorare la presenza di adulti con trappole a feromoni della linea Olytrap di Sumitomo e trattare al raggiungimento della soglia del 2-3 % di infestazione.



Olytrap



Installare Olytrap tra fine fioritura e inizio allegagione

Agosto

Al superamento delle seguenti soglie di drupe infestate:

- 2-3% per olive da olio
- Prime catture per olive da tavola

Ottobre



**KESTREL®**

25-50 ml/hl (0,5 l/ha)

**x2**

2 trattamenti a distanza di 14-18 giorni a seconda del grado di infestazione

**Tempo di carenza: 7 GIORNI**

Massimo 2 trattamenti per stagione

**OPPURE**

## APPLICAZIONE LOCALIZZATA CON ESCHE ATTRATTIVE:

Applicare **KESTREL®** alla dose di 100 ml/ha in 30 l/ha di acqua, con l'aggiunta di un'esca alimentare/attrattiva per il fitofago al 2% o alle condizioni di impiego previste per l'esca.

È sufficiente irrorare il 50% delle piante ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.