

Registrazione: N. 15125 del 13/07/2012
Composizione: Fenpyrazamine 50%
Formulazione: WG - Granuli disperdibili in acqua
Confezioni: Barattolo 1 kg
Gruppo FRAC: 17
ADR: QL
Gruppo imball.: III

Classificazione
CLP
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi: 

Avvertenza: ATTENZIONE
Frase H: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

DPD
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi: 

Informazioni: N - Pericoloso per l'ambiente
Frase R: R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Colture	Avversità controllate	Dosi
Vite da tavola e da vino (7 giorni vite da tavola; 14 giorni vite da vino)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 kg/ha
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchini (solo coltura protetta per le orticole) (3 giorni)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,8-1,2 kg/ha

Si consiglia un trattamento in pre-chiusura del grappolo o uno all'invaiaitura. Max 1 trattamento/anno.

Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Adottare un intervallo fra i trattamenti di 8-12 giorni, in funzione della pressione della malattia. Max 3 trattamenti/anno.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. È obbligatorio l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.).



Prolectus®

**Alta velocità
 contro la botrite**



La scelta del professionista

Un vino di qualità deriva da un'uva di qualità, che a sua volta deriva da agrofarmaci di qualità. E lo stesso vale per gli ortaggi.

Prolectus è un antibotritico innovativo, a base di una molecola esclusiva Sumitomo Chemical, registrato su vite da vino e da tavola e sulle principali orticole in serra.

Sulla vite da vino ha un effetto preventivo che aiuta a ridurre la presenza di laccasi, migliorando la qualità del vino senza influire in nessun modo sulle sue caratteristiche organolettiche.

Su pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo e zucchini in coltura protetta previene e contrasta la botrite, con un tempo di carenza di 3 giorni.

Possiede l'Import Tolerance USA, condizione indispensabile per l'esportazione oltreoceano, ha un ottimo profilo ecotossicologico e ha una formulazione innovativa, basata su sostanze facilmente biodegradabili.




Import Tolerance USA

Prolectus: la scelta sicura per i professionisti della qualità.




Translaminarità



Rapida penetrazione translaminare: blocca lo sviluppo del micelio e non si dilava

Lunga persistenza di azione nei confronti del patogeno

Fenpyrazamine: siti di attacco al patogeno



Elevata efficacia nei confronti della *Botrytis cinerea* in tutte le fasi del suo ciclo biologico

Bassi tempi di carenza (14 giorni uva da vino, 7 giorni uva da tavola, 3 giorni orticole)

Attivo sulla laccasi, enzima prodotto dalla *Botrytis cinerea* che provoca uno scadimento qualitativo del vino

Possiede l'Import Tolerance per l'USA e non interferisce con i processi fermentativi dei mosti e sulle qualità organolettiche dei vini


LMR = 3ppm su vite, pomodoro e melanzana, 0,7 ppm su zuccino e cetriolo

Formulazione innovativa a rapida idrodispersibilità in cui i coformulanti sono a base di sostanze naturali o facilmente biodegradabili

Località	Castelnuovo del Garda (VR)	
Anno	2010	
Varietà	Chardonnay	
Applicazioni	A 09/06 BBCH 77	B 02/08 BBCH 81
Rilievi	07/07 - 17/08	
Centro di saggio	AGREA	



% Efficacia nel rilievo del 17/08



Tesi	Dosi (g/Ha)
1 Prolectus A + B	1.000 + 1.000
2 Standard A + B	800 + 800


TNT Diffusione su grappolo 52,3%
Severità su grappolo 12,5%

2008-2009 (media di 6 prove)

TNT % frutti attaccati
Peperone 83,2%
Zucchino 70,1%




% Efficacia sui frutti



CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'aggitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione. Data la naturale composizione del formulato, per preservarne la massima efficacia, la miscela deve essere utilizzata immediatamente. Per eventuali soste del cantiere di lavoro si raccomanda di conservare la miscela in luogo fresco, lontano da fonti di luce e calore, per evitarne la degradazione che può compromettere l'efficacia.




In presenza di acque con pH superiori a 7,5 si consiglia di acidificare preventivamente l'acqua prima di preparare la miscela. Il prodotto si impiega da solo.


pH



RESISTENZA AL DILAVAMENTO



TRANSLAMINARITÀ



RAINFASTNESS

