

Il controllo delle infestanti e delle altre patologie secondo ASCENZA

Ivan Di Giorgio
Field Marketing & Development
Ivan.digiorgio@ascenza.rovensa.com



OLIVO: l'offerta di ASCENZA



ERBICIDI

||||| **Matsuda® 25 WG**

||||| **Hereu® SC**

||||| **Mohican® 500 SC**

FUNGICIDI

||||| **Kresostar®**

||||| **Vegas® 50 WG**

||||| **Ossiram® 70 Flow**

||||| **Tribasic® Flow New**



Le proposte di ASCENZA® contro il Cicloconio

 **Kresostar®**


ASCENZA®

COMPOSIZIONE	Kresoxym Metile 25% Difenoconazolo 12,5%
FORMULAZIONE	Microgranuli idrodispersibili (WG)
COLTURE e PHI	Olivo (14 gg), Pomacee (35 gg)
TARGET	Cicloconio (Olivo) Ticchiolatura, Maculatura (Pomacee)
POSIZIONAMENTO	Differenziazione grappoli fiorali a apertura corolle (BBCH 50-59 OLIVO) Da punte verdi fino a completo sviluppo del frutto (BBCH 53-79 POMACEE)
DOSE	0,25 – 0,30 kg/ettaro
N° TRATTAMENTI	3 per pomacee 2 per olivo
REGISTRAZIONE	N. 16301 del 23/10/2018

NOVITA'
05/11/2020
OLIVO

	KRESOXYM METILE	DIFENOCONAZOLO
CODICE FRAC	1 Gruppo C3	3 Gruppo G1
MECCANISMO D'AZIONE	Strobilurina QoI	Triazolo IBS
MODALITA' D'AZIONE	Preventivo e curativo	Preventivo e curativo
MOVIMENTO NELLA PIANTA	Fungicida di copertura con capacità translaminari	Fungicida sistemico di lunga persistenza



Punti di forza di **Kresostar®**

Miscela esclusiva
Kresoxym +
Difenoconazolo

Contrasto della
malattia in ogni
suo stadio di
sviluppo

Eccellente
strumento per
strategie
antiresistenza

Lunga persistenza
d'azione ed
elevata efficacia

**RISULTATO
GARANTITO
100%**

Le proposte di ASCENZA® contro il Cicloconio



||||| Vegas® 50 WG

COMPOSIZIONE	Kresoxym metile 50%
FORMULAZIONE	Microgranuli idrodispersibili (WG)
MODALITA' D'AZIONE	Fungicida di copertura con capacità translaminare
COLTURE e PHI	Olivo (non raccogliere prima dello stato di maturazione delle olive)
DOSE	200 g/ettaro
EPOCA olivo	Da inizio bottoni fiorali alla mignolatura

||||| Ossiram® 70 Flow

COMPOSIZIONE	Ossicloruro di rame 700 g/l
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
MODALITA' D'AZIONE	Fungicida di copertura Preventivo
COLTURE e PHI	Olivo (15 gg),
DOSE	150-250 ml/HL (max 2,5 LT/ettaro) Olivo
EPOCA olivo	Applicare in primavera e autunno

||||| Tribasic® Flow New

COMPOSIZIONE	Solfato tribasico di rame 190 g/l
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
MODALITA' D'AZIONE	Fungicida di copertura
COLTURE e PHI	Olivo (14 gg),
DOSE	4 – 4,5 l/ettaro
EPOCA olivo	Da stasi alla ripresa vegetativa Da inizio maturazione drupe alla raccolta




L'occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleagina*)

Una corretta gestione della problematica consiste in una serie di azioni:

- Utilizzo di varietà resistenti
- Sesto d'impianto non troppo stretto
- Potature frequenti
- Gestione delle concimazioni azotate
- Interventi mirati con agrofarmaci



STRATEGIA vs OCCHIO DI PAVONE



OSSIRAM® 70 FLOW

KRESOSTAR®

OSSIRAM® 70 FLOW

TRIBASIC® FLOW NEW

VEGAS® 50 WG

TRIBASIC® FLOW NEW

I applicazione
Post raccolta

II applicazione
Post potatura

I applicazione
Ripresa vegetativa

II applicazione
Pre fioritura

Per disinfettare ferite di
post raccolta e potatura

Per far cadere le foglie
infette e ridurre l'inoculo

Per proteggere le giovani
foglie e bloccare eventuali
infezioni in atto.
Fase molto delicata:
1 presenza di foglie giovani
più sensibili
2 condizioni climatiche
favorevoli alla malattia

In autunno alla comparsa
delle prime macchie sulle
foglie.
Per far cadere le foglie infette
e ridurre l'inoculo, in miscela
anche con insetticidi
(DELTASAP)

La gestione delle erbe infestanti secondo ASCENZA



Controllo delle erbe infestanti nell'oliveto secondo ASCENZA

||||| Matsuda® 25 WG

Flazasulfuron 25%

Granuli idrodispersibili WG



Attenzione

Erbicida sistemico e residuale

Solfonilurea – Gruppo B2
(inibitore enzima ALS)

Ampio spettro: graminacee e
dicotiledoni annuali e perenni

In pre emergenza o su infestanti
max 4 foglie e 10 cm H

Dose: 60 – 100 g/ettaro

Intervallo sicurezza 45 gg

||||| Hereu® SC

Oxyfluorfen 500 g/l

Sospensione Concentrata SC



Pericolo

Erbicida pre e post emergenza

Inibitore dell'enzima PPO
Gruppo E

Graminacee e dicotiledoni annuali

In pre emergenza o su infestanti in
attiva crescita

Dose: 0,9 l/ettaro

Intervallo sicurezza 7 gg

||||| Mohican® 500 SC

Diflufenican 500 g/l

Sospensione Concentrata SC



Attenzione

Erbicida ad azione fogliare e
residuale

Sbiancanti –Gruppo F1
(inibitore biosintesi carotenoidi)

dicotiledoni annuali

In pre emergenza o su infestanti 2-
4 foglie

Dose: 0,5 – 0,56 l/ettaro

Intervallo sicurezza 35 gg



Erbicidi ASCENZA: flessibili, pratici, efficaci



ASCENZA®

MATSUDA
25 WG



Glifosate o
erbicidi di
contatto



Su
infestanti
sviluppate

MATSUDA
25 WG



MOHICAN
500 SC
o
HEREU SC



Su
infestanti
giovani

Lavorazione
del terreno
(su terreno
nudo)




MATSUDA
25 WG



In pre
emergenza

- ✓ Controllo ottimale di tutte le infestanti presenti
- ✓ Controllo totale sulle infestanti difficili (Conyza, lolium, Malva)
- ✓ Lunga persistenza d'azione (terreno pulito per 3-5 mesi)
- ✓ Più facile gestione della flora infestante negli anni successivi
- ✓ Gestione più sostenibile dell'oliveto



PERIODO DI APPLICAZIONE



Le prove in campo

ANNO	2020
LOCALITA'	Andria (BT)
COLTURA	Olivo
TITOLO	Efficacia di Flazasulfuron, Diflufenican e Oxyfluorfen per il controllo delle infestanti difficili (Conyza, Loilium, Malva)

N° tesi	Nome commerciale	Principio attivo	Dose di p.a. L- Kg /Ha	Timing	
1	NON TRATTATO	-			
2	MATSUDA 25 WG + ROUNDUP POWER 2.0	Flazasulfuron + glifosate	0,08 + 3	28-gen	A
3	MATSUDA 25 WG + MOHICAN 500 SC	Flazasulfuron + diflufenican	0,08 + 0,6	28-gen	A
4	MATSUDA 25 WG+ HEREU SC	Flazasulfuron + oxifluorfen	0,08 + 0,9	28-gen	A
5	MATSUDA 25 WG	flazasulfuron	0,08	29-feb	B

TIMING E MODALITA' D'IMPIEGO

A: Tappeto erboso con altezza max 10-15 cm.

B: fine inverno dopo una leggera lavorazione



SITUAZIONE DEL CAMPO AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO (28/01)



T2 (MATSUDA + GLIFO 80g + 3 l/ha appl. 28/01)



04 mag	Efficacia %
Lolium m.	100%
Erigeron c.	100%
Calendula a.	100%
Fumaria o.	100%
Malva s.	99%
Capsella b.	100%
Sonchus	100%
Matricaria c.	100%
Convolvolo a.	75%



T3 (MATSUDA + MOHICAN 80g + 0,6 l/ha appl. 28/01)



26/02 DAA 30



18/03 DAA 50



04/05 DAA 98

04 mag	Efficacia %
Lolium m.	80%
Erigeron c.	85%
Calendula a.	100%
Fumaria o.	100%
Malva s.	80%
Capsella b.	90%
Sonchus	100%
Matricaria c.	100%
Convolvolo a.	80%



T4 (MATSUDA+HEREU SC 80g + 0,9 l/ha appl. 28/01)



Per il completo disseccamento
delle infestanti bisogna
attendere almeno 40 gg

04 mag	Efficacia %
Lolium m.	90%
Erigeron c.	87,5%
Calendula a.	95%
Fumaria o.	100%
Malva s.	77,5%
Capsella b.	65%
Sonchus	100%
Matricaria c.	100%
Convolvolo a.	62,5%



T5 (MATSUDA 80/ha appl. 29/02 post lavorazione)



Si nota la sola presenza di Convolvolo da rizoma
Importante per questo tipo di applicazioni è la
lavorazione del terreno e le piogge dopo il
trattamento



04 mag	Efficacia %
Lolium m.	90%
Erigeron c.	100%
Calendula a.	100%
Fumaria o.	100%
Malva s.	100%
Capsella b.	100%
Sonchus	100%
Matricaria c.	100%
Convolvolo a.	72%



Situazione del testimone al 04/05



GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE



Ivan Di Giorgio
Field Marketing & Development
ASCENZA ITALIA

Ivan.digiorgio@ascenza.rovensa.com

Seguici



[Youtube](#)



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)

