



## KALIDOS LG

Kalidos LG è un concime organico azotato costituito da estratti vegetali e amminoacidi. Kalidos LG contrasta lo spacco dei frutti determinato da piogge intense, rafforzando la parte strutturale della pianta (parete cellulare). KALIDOS LG promuove i processi di fioritura e di sviluppo dei frutti, agisce positivamente sulla divisione e differenziazione cellulare stimolando lo sviluppo della parte epigea della pianta.



**Formulazione** Composizione  
Liquida N organico 3%  
C organico 10%

**Confezioni**  
FLACONI  
12 x 1 L  
TANICHE  
4 x 4 L

### Descrizione prodotto

Kalidos LG è un concime organico azotato costituito da estratti vegetali e amminoacidi. Kalidos LG contrasta lo spacco dei frutti determinato da piogge intense, rafforzando la parte strutturale della pianta (parete cellulare). KALIDOS LG promuove i processi di fioritura e di sviluppo dei frutti, agisce positivamente sulla divisione e differenziazione cellulare stimolando lo sviluppo della parte epigea della pianta.



Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
Melo, Pesco, Albicocco, Susino, Actinidia, Piccoli Frutti, Ciliegio, Pomodoro, Vite.	Fogliare	1-1,5 L/ha	Come anti-cracking: Effettuare 2- 4 trattamenti. Effettuare almeno un trattamento 3-4 gg prima e almeno uno 4-5 gg dopo eventuali eventi piovosi. In particolare su ciliegio e uva da tavola, bagnando bene i frutti: • In preinvalitatura (schiarimento ciliegia, rammollimento dell'acino nell'uva) ..... 150 ml/l • Inizio invaiatura, e non prima di 4 giorni dal precedente.....150 ml/l • Terzo e quarto intervento a distanza di 4-5 giorni, in previsione di piogge.....150 ml/l
Melo, Ciliegio, Pesco, Albicocco, Vite	Fogliare	500 ml/l	Per incrementare la dimensione, il colore e il contenuto di zucchero del frutto: trattare dopo la allegagione e ripetere ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
Actinidia	Fogliare	300 ml/l	Per incrementare la dimensione del frutto: 3-4 trattamenti a 7-10 giorni dalla caduta dei petali.
Ortaggi foglia verde	Fogliare	500 ml/l	Per la conservazione in post-raccolta: 2 trattamenti fogliari, il primo a 30% sviluppo coltura, il secondo a 60% sviluppo coltura
Pomodoro	Spennellato	Puro o diluizione max. 1:1	Per il rafforzamento del rachide che sostiene i frutti. Spennellare il rachide per un breve tratto (MAX 4-5 cm), nel punto in cui si incurva.