



AUXIGER LG (NAD 1,5% + NAA 0,6%)

Fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante.

N.Registrazione Reg N° 12114 del 31/05/2006 del Ministero della Salute

Intervallo di sicurezza: melo,
pero, pesco, olivo 30 gg;
fragola 27 gg;
pomodoro, peperone,
zucchino, melanzana 7 gg

Composizione

NAD (Amide dell'acido
naftilacetico) puro 1,5 g (16,9
g/l)
NAA (Acido alfa naftilacetico)
puro 0,6 g (6,7 g/l)
Coformulanti q. b. a 100 g

Formulazione

Liquida

Confezioni

FLACONI
50 x 100 ml
24 x 500 ml
12 x 1 L
TANICHE
4 x 5 L

Descrizione prodotto

AUXIGER LG è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante, è basato su due principi attivi di natura auxinica e consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali. Il prodotto è in grado di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. AUXIGER LG è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e la formazione di frutti a seme normale. Applicato per via radicale, favorisce l'ingrossamento degli ortaggi da frutto.

Modalità d'uso

Auxiger LG è impiegato, come allegante, in fase di fioritura ripetendo il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti o intervenendo ad intervalli regolari distanziati di una settimana. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento della pezzatura e la precocità di maturazione.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo:H319 Provoca grave irritazione oculare.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE

Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
Melo	Fogliare	140-180 ml/hl	

Pero	Fogliare	140-180 ml/hl	Ad eccezione dell'Abate, è sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima). Sono sconsigliabili irrorazioni con il 100% dei fiori aperti e dopo. Per migliorare l'allegagione si consiglia l'associazione con concimi fogliari a base di boro. Le dosi di impiego si riferiscono ad un volume di irrorazione di 1200 l per ettaro.
Pero Abate Fétel	Fogliare	180 ml/hl	Effettuare un trattamento con Auxiger LG a 10 % di fiori aperti ripetendo a 50% di fiori aperti. È anche possibile effettuare il trattamento a bottoni bianchi con 2 L/ha di Auxiger LG seguito a 10-20 % di fiori aperti da un trattamento con Progerbalin LG a 200-300 ml/ha. Ripetere il Progerbalin LG 2-3 giorni dopo allo stesso dosaggio.
Pero Decana del Comizio	Fogliare	130-150 ml/hl	È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima).
Pero Passa Crassana, William	Fogliare	180-230 ml/hl	È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima).
Pero altre varietà	Fogliare	180-280 ml/hl	È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima).
Pesco	Fogliare	50-70 ml/hl	Da fine caduta petali per stimolare l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione dei frutti. Effettuare 2-4 trattamenti.
Olivo	Fogliare	50-70 ml/hl	In prefioritura e ad inizio fioritura. Per migliorare l'allegagione.
Zucchini	Fogliare	50-70 ml/hl	Effettuare i primi trattamenti ai dosaggi più bassi, proseguire con i trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni aumentando progressivamente il dosaggio sino a raggiungere la dose massima.
Zucchini	Radicale	200 ml/1000 m2	Effettuare la prima applicazione quando compaiono i primi fiori chiusi. Ripetere ogni 7 giorni fino alla fine del ciclo.
Pomodoro	Fogliare	50-70 ml/hl	Eseguire il trattamento ad ogni fioritura. Su pomodoro da mensa è possibile anticipare ed uniformare la fioritura irrorando l'infiorescenza appena differenziata e con i fiori ancora chiusi.
Pomodoro	Radicale	200 ml/1000 m2	Effettuare la prima applicazione quando le piante sono al terzo palco di pomodori e il diametro medio dei frutti sia all'incirca come quello di un uovo di gallina. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.
Peperone, melanzana	Fogliare	50-70 ml/hl	Eseguire il trattamento ad ogni fioritura.
Peperone, melanzana	Radicale	200 ml/1000 m2	Effettuare la prima applicazione quando i frutti raggiungono il 50% della dimensione finale. Ripetere ogni 10 giorni fino alla fine del ciclo.
Fragola	Fogliare	50-70 ml/hl	Irrorare durante la fioritura e ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni.
Fragola	Radicale	200 ml/1000 m2	Effettuare la prima applicazione quando i primi frutti cominciano a virare di colore. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo.
Floricoltura e piante ornamentali	Fogliare	50-70 ml/hl	Anticipa la fioritura.

Floricoltura e piante ornamentali	Radicale	200 ml/1000 m ²	Per un anticipo della fioritura e una accelerazione della crescita, trattare ad intervalli regolari.
Gelate	Fogliare	50-70 ml/hl	Trattare preferibilmente 24 ore prima della gelata o entro le 24 ore successive, durante le ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare del fenomeno.
gelate	Fogliare	50-70 ml/hl	Trattare preferibilmente 24 ore prima della gelata o entro le 24 ore successive, durante le ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare del fenomeno

Note aggiuntive prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.