



Oidio





**Periodo di incubazione 5-6 gg, t 25-30°C, U 80%
18-20gg, t 10-13°C**



Penetrazione attiva



Spaccature che favoriscono l'insediamento della botrite



Manifestazioni su tralcio



CUSTODIA



Azoxystrobin 120 g/L + Tebuconazole 200 g/L

Coltura	Patogeno	Dosi di impiego (L pf/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max applicazioni /anno
Cetriolo, Zucchini	Oidio (Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 - 14	3
Melone, Cocomero	Oidio (Erysiphe spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 - 14	3
Pomodoro, Melanzana	Oidio (Leveillula taurica, Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 - 14	3
Peperone	Oidio (Leveillula taurica, Sphaerotheca spp., Erysiphe spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 - 14	2
Aglio, Cipolla	Ruggini (Puccinia spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 - 14	2
Vite	Oidio (Uncinula necator)	0,75	500-1000	10 - 14	2

Coltura	Patogeno	Dosi di impiego (L pf/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max applicazioni /anno
Grano tenero e duro, Triticale	Fusariosi (Fusarium spp.); Oidio (Erysiphe spp.); Ruggini (Puccinia spp.); Septoria (Septoria spp.)	1 - 1,25	100-500	14 - 21	2
Orzo	Oidio (Erysiphe spp.); Ruggini (Puccinia spp.); Rincosporiosi (Rhynchosporium spp.); Maculatura reticolata (Pyrenophora spp.)	1 - 1,25	100-500	14 - 21	2



INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA

Coltura	Numero giorni
Grano tenero e duro, Triticale, Orzo	35
Cetriolo, Zucchini	3
Cocomero, Melone	7
Pomodoro, Melanzana, Peperone	3
Aglio, Cipolla	21
Vite	21



POSSIBILE LINEA DIFESA ANTIOIDICA



GEMMA D'INVERNO GEMMA COTONOSA 	APERTURA GEMME PUNTA VERDE 	FOGLIE DISTESE 	GRAPPOLI VISIBILI 	GRAPPOLI SEPARATI PRE FIORITURA 	FIORITURA 	ALLEGAGIONE 	PRECHIUSURA GRAPPOLO 	CHIUSURA GRAPPOLO 	INVAIATURA MATURAZIONE 
--	--	--	---	--	---	---	--	---	--



Alternanza dei meccanismi di azione e non dei prodotti



Grazie per l'attenzione